Статьи, помещенные на окне «Дискуссии» сайта «Конган (здоровье)» государственной сети

1. Клинический опыт в лечении больного раком ободочной кишки на последней стадии

ID:pih19790308
Фамилия и имя: Пэк Иль Хёк
Дата рождения: 8 марта 1979 г.
Профессия: терапевт Ракранской районной больницы.
Тел.: 191-649-8933

Сегодня я расскажу о моем опыте лечения, то есть, как с помощью Кымдан-2 инъекции поставил на ноги пациента, которому поставили диагноз – последняя стадия рака ободочной кишки.
Возраст больного – 56 лет. Мужчина. В сентябре 2022 года при госпитализации у него установлена опухоль ободочной кишки размером 31×30 мм, опухоль мочевого пузыря (метастастическая) размером 28×25 мм. Симптомы: вызываемая раком боль (в частности, примерно 10-разовое выделение в день экскрементов через пенис, сопровождаемое нестерпимой болью), невысокая температура, расстройство пищеварения, вздутие живота, тяжесть в животе. Больного привезли в нашу больницу, когда медики НИИ онкологии уже заключили, что у него последняя стадия рака ободочной кишки, к тому же, метастаз охватывает соседние органы, поэтому отсутствует возможность операции по удалению опухолевых клеток.
Результат анализа крови с конечностей – WBC11700, ESR52, а мочевой анализ оказался невозможным из-за выделения мочи вместе с экскрементами. Сам пациент, потеряв надежду на жизнь, отказался и от лечения противораковыми препаратами, считая, что это только приблизит день смерти.
Приходилось заниматься симптоматическим лечением, применяя день за днем только инфузионную терапию, антибиотики и болеутоляющие средства. А опухоль быстро росла: через 3 месяца УЗИ подтвердило, что опухоль ободочной кишки увеличилась до 70×50 мм, а опухоль мочевого пузыря – до 50×39 мм, и состояние больного стало более тяжелым.
Я, его лечащий врач, с учетом состояния пациента счел необходимым сдерживание быстрого увеличения опухоли путем повышения иммунитета, чтобы максимально продлить его жизнь. И по желанию пациента начал использовать не современные противораковые средства, дающие зачастую побочные действия, а Кымдан-2, являющуюся иммуноoптимизатором растительного происхождения.
Сначала пациент прошел 1 курс лечения (7 упаковок) по второму варианту инструкции, и у него наблюдалось постепенное ослабление боли. После перерыва на 15 дней предложил пациенту пройти еще один курс лечения. Теперь уже у него постепенно исчезало выделение экскрементов по мочеиспускательному каналу, смягчались и уменьшались симптомы тяжести в нижней части живота, боли и вздутия живота.
Я думал: «Раз так, не уменьшилась ли опухоль в какой-то мере?» С надеждой советовал пациенту пройти УЗИ, и получился неожиданный результат – опухоль ободочной кишки уменьшилась до 51×32 мм, а метастаз мочевого пузыря – до 35×27 мм.
Поразительный факт, что только введение Кымдан-2 без применения химической и лучевой терапии привело к сокращению опухолевых клеток, вселил в пациента и нас, врачей, твердую уверенность в возможности излечения рака. Пациент снова обрел надежду на жизнь.
Пациент прошел всего 4 курса лечения (28 упаковок). На момент 29 мая состояние пациента следующее: по УЗИ отмечено рекордное уменьшение опухоли ободочной кишки до 32×20 мм, опухоли мочевого пузыря – до 14×13 мм, результат гемотеста –

WBC8000, ESR20, результат мочевого анализа: белок – 0,01%, нет мочевого осадка, исчезли боль, температура и расстройство пищеварения. Пациент уже не прикован к постели, межет вести нормальную жизнь, в настоящее время иногда выходит на работу. Больные раком ободочной кишки на последней стадии с метастазом соседних органов при применении самой сильной химической терапии обычно сохраняют жизнь максимум до 6 месяцев. Однако монотерапия с применением Кымдан-2 не только подавляла рост опухоли, но и значительно сократила ее и позволила больному подняться с постели. На этом примере я и мои коллеги стали очевидцами удивительного противоопухолевого эффекта Кымдан-2.
В заключение хочу приносить свою признательность разработчикам Кымдан-2, которые изобретением замечательного препарата нашего образца вносят вклад в улучшение здоровья населения, и желаю, чтобы мой опыт помог всем онкологам и больным раком.

Продолжение
ID:pih19790308
Фамилия и имя: Пэк Иль Хёк
Дата рождения: 8 марта 1979 г.
Профессия: терапевт Ракранской районной больницы.
Тел.: 191-649-8933

Здравствуйте!
Выражаем признательность всем посетителям сайта, которые откликнулись на мою скромную статью.
У пациента с раком ободочной кишки, которым интересуются все, в сегодняшний день, то есть через 13 месяцев после установки рака, более улучшилось состояние.
Ныне у него совсем нет эфемерной лихорадки, наблюдавшейся время от времени, все показатели в норме.
До сих пор он не принимал никаких препаратов и применяет только Кымдан-2 и порошок хонсама (поваренный и сушеный женьшень).
В июле прошел УЗИ, а размер опухоли ободочной кишки опять сократился от 32×20 мм до 25×15 мм, показатели по анализу мочи нормальные, общее состояние улучшалось.
Когда поставлен диагноз заболевания раком последней стадии, его вес не достигал 50 кг (нормальный вес – 65 кг.), а сейчас – 60 кг. Он твердо уверен, что преодолеет болезнь.
Желаю, чтобы пример моего пациента придавал надежду и смелость многим больным опухолью.

2. «Кымдан-2 инъекция» – панацея от всех недугов.

ID:kkn0903
Фамилия и имя: Ким Гван Нам
Дата рождения: 3 сентября 1973 г.
Профессия: директор Предприятия по разработке ИТ-изделий при Мокранском техническом бюро «Кванмён».
Контакт: 191-395-4557

Здравствуйте!
Я только сегодня успел посетить сайт «Конган». Шлю теплый привет администраторам сайта, прилагающим искренние усилия для улучшения здоровья населения, и абонентам этого сайта. Мне хотелось бы писать о «Кымдан-2», и публикую эту статью для тех, кого подозревают в заболевании раком или у кого уже подтвердили этот недуг.

В октябре 2019 года моя мать получила диагноз – рак молочной железы (первая стадия).
Она вообще-то не заболевала и даже не ожидала, что регулярный тест на мастопатию выявит рак. Ее возраст уже солидный (в то время 67 лет), поэтому она хотела обойтись без хирургического вмешательства и как-то узнала о хорошем эффекте препарата «Кымдан-2» в повышении иммунитета и лечении рака.
Итак она начала внутривенное вливание этого препарата.
Через полгода прошла медосмотр, и ей сказали, что по снимке опухолевые клетки увеличились и рак перешел от первой на вторую стадию. В то время ей уже ввели примерно 250 ампул «Кымдан-2».
«Теперь все!» – с такой мыслью она так и решилась на хирургическую операцию
После операции гистопатологи не могли не удивиться сильно результату анализа.
Дело было в том, что иммунные клетки плотно обложили собой, как ширмой, опухолевые клетки, и на самом деле рак не увеличился, а только выглядел больше на снимке.
Сам врач признался, что он впервые увидел такое явление.
В итоге получилось так: если бы моя мать продолжала лечиться без хирургической операции, то опухолевые клетки могли бы не увеличиться или исчезнуть, о чем уже точно сказать не могу, но из-за отсутствия уверенности в препарате «Кымдан-2» пошла на операцию
Только тогда я вспомнил, как я 9 лет назад вылечился от гнездной алопеции с помощью «Кымдан-2».
Тогда я слышал, что причиной алопеции могут быть разные факторы, но главным из них является сниженный иммунитет, и попробовал применять этот препарат – иммуностимулятор.
Спустя около 5 дней не мог не удивиться: быстро росли черные волосы. Дней через 20 трудно было найти и след плешивости.
До сих пор рецидива нет.
Поистине, не могу не удивиться эффекту «Кымдан-2» – отсутствию побочных действий и чрезвычайному повышению иммунитета. Хочу еще раз поблагодарить разработчиков за такой замечательный препарат, помогший мне в излечении недуга.
«Кымдан» – это панацея от всех недугов, лучшее в мире средство.
Желаю, чтобы опыт лечения моей матери и мой собственный опыт помогли посетителям сайта.

3. Чрезмерное употребление антибиотиков и способ преодоления его

ID:kfs0226
Фамиля и имя: Ким Хё Сун
Дата рождения: 26 февраля 1989 г.
Профессия: Педиатр Детской больницы «Окрю»
Контакт: 195-319-0793

Здравствуйте!
Как педиатр я хочу рассказать о нецелесообразности чрезмерного употребления антибиотиков, которое может повлечь за собой часто наблюдаемые у детей палимдромический злокачественный грипп, снижение аппетита и различные осложнения, вызываемые мутацией, и способах его преодоления.
Палимдромический злокачественный грипп и снижение аппетита, которые часто встречаются в последнее время у детей, связаны с неподходящим, чрезмерным употреблением антибиотиков.
Чуть насморк у ребенка, и сразу дать ему антибиотик – это неправильный подход.

Антибиотик надо принимать по необходимости чувствительный, только оптимальную дозу и на подходящее время.
Однако многие люди используют антибиотики наугад – без рецепта врача, что вызывает у детей, у которых пока незрелы все кишечники, снижение иммунитета и различные осложнения.
Антибиотики сильны и токсичным действием в отношении нормальных клеток, поэтому они в организме могут вызвать расстройство функции печени, пищеварения и усвояемости, а дальше – снижение иммунитета и нарушение гомеостаза. В частности, в отношении еще незрелых детей очень важно правильно соблюдать принцип применения антибиотиков.
Кроме того, ненаучное использование тех или иных антибиотиков вызывает устойчивость микроорганизмов и вирусов к антибиотикам,
Ошибочно думать, что в случае простуды первым делом надо принимать антибиотики. В сегодняшние дни, когда распространяются зловредные вирусы, эффективнее, чем антибиотики, повышение естественного иммунитета с целью выработки в самом организме иммунного вещества.
В случае применения антибиотиков, которые обычно снижают естественный иммунитет, очень важны правильный выбор антибиотиков и принцип лечения ими.
В отличие от применения антибиотиков повышение естественного иммунитета максимально способствует росту детей и значительному снижению вероятности рецидива болезни.
Кымдан-2 представляет собой средство, обладающее ярким местным и общим лекарственным действием. Например, при острой и хронической ангине, язвенном поражении полости рта и пищевода, воспалении горла и гортани, бронхите прием ее раствора внутри вместе с опрыскиванием на место поражения легко устраняет симптомы поражения на месте и улучшает состояние.
Детям более эффективен прием внутри, чем укол, поэтому применяется метод местного опрыскивания.
Более того, при бронхиальной астме и спазме желудочного пилорического сфиктера лучше принимать раствор внутри, чем вливать его.
Применение этого раствора улучшает стул детей и без использования средств от поноса и запора, так как его воздействие внутри глотки-пищевода-двенадцатиперстной кишки до, после и во время еды ускоряет поглощение пищи организмом и помогает абсорбции пищи путем удлинения времени пребывания пищи внутри кишечника.
И те, кто потерял аппетит, страдает кахексией, послеоперационной непроходимостью кишечника или послеоперационными осложнениями, могут получить хороший эффект после первоочередного применения этого средства.
В случае детей в возрасте от 1 до 6 лет, которые наиболее подвержены простуде, во время появления у них насморка и других начальных симптомов простуды лечение хлорфениламином (дозу определяют по возрастам и дают только утром и вечером) вместе с вспрыскиванием Кымдан-2 в полость рта помогает рано устранить симптомы простуды и значительно сокращать срок заболевания простудой.
Хотя сейчас появляются различные заболевания и мутационные вирусы, но вполне возможно преодолеть все это, если поддерживать в оптимальном состоянии естественный иммунитет с помощью многофункциональных средств для повышения иммунитета, включая Кымдан-2, диеты, натуропатии и кинезитерапии. Вот о чем я хочу сказать.
Конечно, в лечении болезни важен и выбор антибиотика и других средств для устранения ее основной причины, но я считаю, что одним из способов противостояния заболеваниям, вызываемым мутационными вирусами, является переход от прежней формулы «выбор №1 – антибиотики» к формуле «выбор №1 – многофункциональное иммунное средство».

Желаю медработникам и матерям принимать к сведению мое мнение. Жду хороших советов.

Ниже следует часть из клинических данных, помещенных на окне «Дискуссии» сайта «Конган (здоровье)» государственной сети.

1. Сколько еще принимать лекарства?

ID:ryg99527
Фамилия и имя: Ли Юн Гён
Дата рождения: 27 мая 1979 г.
Профессия: Клиника Пхеньянского медицинского института. Старшая медсестра
Контакт: 191-571-1286

У меня 16-летний сын.
Я желаю, чтобы он хорошо учился и обязательно поступил в вуз.
2 года назад сын начал жаловаться на головную боль, головокружение и тошноту. Думала, что это у него от усталости, и давала ему успокаивающие средства, чтобы он засыпал.
Сначала показалось, что это действует, но с течением времени учащался прием препарата и дальше повторялись такие симптомы. К тому же препарат плохо действовал: потеря аппетита, плохая сосредоточенность во время учебы.
Я забеспокоилась и решила обратиться в специальную больницу. Эхоэнцефалограмма и электроэнцефалограмма подтвердили: нет у него никакой болезни. Но меня, мать, мучил вопрос: «В чем же проблема?» Узнала о капсулах «Хёлгунбуллочжон», покупала 3 упаковки препарата и дала ему принимать.
Он принимал по 5 капсулам 3 раза в день, а с пятого дня начала устраняться головная боль.
Читая статью, помещенную на сайте «Конган», я узнала, что мой сын потерял аппетит из-за снижения функции селезенки и желудка, вызванного большими умственными нагрузками, и решила использовать капсулы в комбинации с Кымдан-2.
Сейчас у сына почти устранялся симптом тошноты, с аппетитом кушает, спит глубоким сном, улучшилась сосредоточенность.
Мне кажется, что теперь достаточно принимать одни капсулы «Хёлгунбуллочжон».
Сколько упаковок надо принимать в год? Хочу получать совет специалиста.
Контакт: 191-571-1286

Ответ Фармацевтической компании «Пуган»: если исчезли симптомы, то можно сократить или уменьшить дозу и частоту приема или вообще прекратить принимать, а в случае предчувствия или возникновения рецидива начинать прием препарата.
Что касается вопросов, не озвученных в находящейся в упаковке инструкции по применению «Хёлгунбуллочжон», рекомендуется обратиться к врачам нашей компании Чон Чу Хян (тел.: 1912592704) и Ким Су Хян (тел.: 1915662751).

2. Хочу узнать способ применения препарата «Хёлгунбуллочжон».

ID:jys48726
Фамилия и имя: Чон Ён Сон
Дата рождения: 26 июля 1948 г.
Профессия: советник по техническим вопросам Агентства по техническому обмену «Сольгван»
Контакт: 191-585-8922

Мне в этом году исполнилось 76 лет.
Мой рост – 175 см, немного худой.
Занимаюсь научно-исследовательской работой, весь день работаю на компьютере.
5 лет назад начались предвестники болезни из-за аритмии, и даже симптомы расстройства кровообращения – онемение конечностей, тяжесть и боль в голове от гипертонии, руки постоянное холодные и т. д.
После установления диагноза принял капельное вливание, использовал разные лекарства, считающиеся хорошими, но эффект был сиюминутным – продолжался болезненные симптомы.
3 месяца назад начал принимать препарат «Хёлгунбуллочжон». Сейчас уже стабилизировано кровяное давление, сердце работает нормально, исчезли головная боль и онемение конечностей. В общем, нормально чувствую себя и увлекаюсь исследовательской работой. Сейчас принимаю по 5 капсулам «Хёлгунбуллочжон» 3 раза в день. Хотелось бы узнать, можно ли прекратить применение препаратов для нормализации кровяного давления или необходима комбинация. Говорят, что капсулы «Хёлгунбуллочжон» охраняют стенки кровеносных сосудов. Эффективны ли они и для профилактики стенокардии и инфаркта миокарда?

Ответ Фармацевтической компании «Пуган»: препараты для стабилизации кровяного давления, являющиеся химическими, и оздоровительный продукт «Хёлгунбуллочжон» только сотрудничают друг с другом и не оказывают антагонистического действия. Тем не менее, не будем предлагать обязательно совместить их или воздержаться от этого. Можете просто повторять способ: прекратить прием препаратов для стабилизации кровяного давления и на некоторое время и принимать только «Хёлгунбуллочжон», а если это не приносит удовлетворительного результата, можно принимать их вместе с «Хёлгунбуллочжон». Капсулы «Хёлгунбуллочжон» заметно предотвращают стенокардию и инфаркт миокарда, эффективны и в их лечении.
Что касается вопросов, не озвученных в находящейся внутри упаковки инструкции по применению «Хёлгунбуллочжон», рекомендуется обратиться к врачам нашей компании Чон Чу Хян (тел.: 1912592704) и Ким Су Хян (тел.: 1915662751).

3. Помогите, пожалуйста, моей матери.

ID:pch513
Фамилия и имя: Пак Чхоль Хо
Дата рождения: 13 мая 1984 г.
Профессия: научный сотрудник Объединения НИИ «711»
Контактный номер: 195-571-6445

Здравствуйте!
Моей матери исполнилось 68 лет в этом году. Ее рост – 155 см. Вес – 53 кг. Кровь группы О.
В молодости она страдала гипотонией (80/50 мм ртутного столба). А во второй половине 50-летнего возраста у нее кровяное давление подскочило до 180/100〜110 мм ртутного столба, и при повышенном кровяном давлении жаловалась на тошноту, онемение конечностей и духоту в груди.
Поэтому более 2 раза в году применяла препарат для восстановления церебрального метаболизма в течение 10 дней.
Однако со временем препарат не приносил заметного эффекта.
Как-то она узнала о капсулах «Хёлгунбуллочжон» и принимала их: сначала по 9 капсулам 3 раза в день до еды в течение 15 дней, потом 2 раза в день утром и вечером.

Так прошло около 2 месяцев, и у матери исчезли, как рукой сняло, симптомы онемения конечностей, на которые она жаловалась больше всего, значительно улучшилось настроение. В частности, цвет губ становился алым, и она стала выглядеть здоровой.
С тех пор мать постоянно принимает этот препарат по 5 капсулам в день утром и вечером.
Пусть это оздоровительный продукт, но принимать его круглый год затруднительно.
Так что хотелось бы узнать о самом эффективном методе лечения этим препаратом, дозе применения и курсе лечения.

Ответ Фармацевтической компании «Пуган»: предлагается после устранения симптомов уменьшить дозу и частоту применения или вообще прекратить прием, а когда симптомы начинают дать о себе знать или возникают – снова принимать.
Что касается вопросов, не озвученных в находящейся внутри упаковки инструкции по применению «Хёлгунбуллочжон», рекомендуется обратиться к врачам нашей компании Чон Чу Хян (тел.: 1912592704) и Ким Су Хян (тел.: 1915662751).